

## EC FERTILIZER

Bor (B), Bakır (Cu- Sulfat), Demir (Fe-Sulfat), Mangan (Mn-Sulfat) ve Çinko (Zn-Sulfat)  
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

## MİCRON

### TAMAMI SUDA ÇÖZÜNÜR

#### GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	(W/W)
Suda Çözünür Bor (B)	% 0,5
Suda Çözünür Bakır (Cu)	% 0,5
Suda Çözünür Demir (Fe)	% 4
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 4
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 4



ASLA UYGUN DOZ ORANINI AŞMAYIN

SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ.



ÜRETİCİ FİRMA

ODAK TARIM TİCARET. LTD. ŞTİ.

S.S.Antalya Toptancılar Birliği Kooperatifi 108 Ada C Blok No: 5 Döşemealtı /ANTALYA

Tel:0 242 322 01 88 Fax:0 242 3130527 www.odaktarim.com

**UYARILAR :**\* Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz. \*Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas ettiğinde, hemen bol su ile yıkayınız, yutmayınız. \*Yutulması halinde, doktora başvurunuz. \*Gübreleme esnasında, Maske, Eldiven ve Gözlük kullanınız.\*Boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, imha ediniz. \*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

**DEPOLAMA ŞARTLARI:**\*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0°C / + 40 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. \*Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. \* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

**ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ:** Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür, hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

**KARIŞABİLİRLİK:** Birçok gübre ve zirai ilaç ile karışabilir. Karıştırmadan önce test edilmesi tavsiye edilir.

**FİRMA BEYANI:** Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Spesifikasyona uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

LİSANS NO: 422      TESCİL NO:      PARTİ/SERİ NO:      ÜRETİM TARİHİ:  
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim Tarihinden İtibaren 3 Yıldır.

Ürünün Garanti Edilen Net Ağırlıkları veya Hacimleri:  
Net Ağırlık: 0,25-0,5-1-2-3-4-5-10-15-20-25- 30 -40- 50 kg



ÜRÜNLER	UYGULAMA ZAMANI VE MİKTARI
	YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN KULLANIM ZAMANI VE DOZU
DOMATES, BİBER, PATLICAN FASULYE V.S.	<b>YAPRAKTAN;</b> Meyve tutumundan itibaren 15 gün arayla 60 gr /100 lt su 2 uygulama <b>TOPRAKTAN;</b> Fide dikiminden itibaren 20 gün arayla 250 gr /da. 2 uygulama.
KABAK, HIYAR.	<b>YAPRAKTAN;</b> Meyve tutumundan itibaren 15 gün arayla 60 gr /100 lt su 2 uygulama <b>TOPRAKTAN;</b> Fide dikiminden itibaren 20 gün arayla 250 gr / da. 2 uygulama.
KAVUN, KARPUZ, ÇİLEK.	<b>YAPRAKTAN;</b> Meyve tutumundan itibaren 15 gün arayla 60 gr /100 lt su 2 uygulama <b>TOPRAKTAN;</b> Fide dikiminden itibaren 20 gün arayla 250 gr / da. 2 uygulama.
TURUNÇGİLLER, ZEYTİN, ELMA, ARMUT, KİRAZ, FINDIK, KAYISI, ŞEFTALİ, ERİK, BADEM	<b>YAPRAKTAN;</b> Tomurcaklanma döneminden itibaren 15 – 20 gün arayla 60 gr /100 lt su ile 2 uygulama.
BAĞ	<b>YAPRAKTAN;</b> Sürgünler 30-35 cm olunca 15 -20 gün arayla 60 gr /100 lt su 2 uygulama <b>HASATTA;</b> 60 gr / 100 lt su ile 1 uygulama.
MUZ	<b>YAPRAKTAN;</b> Vejetatif gelişme başlangıcından itibaren 15 gün arayla 60 gr /100 lt su 2 uygulama <b>TOPRAKTAN;</b> Vejetatif gelişme başlangıcında 250 gr /da 1 uygulama.
SÜS BİTKİLERİ ve KESME ÇİÇEKÇİLİK	<b>YAPRAKTAN;</b> Vejetatif gelişme başlangıcından itibaren 15 gün arayla 60 gr /100 lt su 2 uygulama <b>TOPRAKTAN;</b> Vejetatif gelişme başlangıcında 250 gr /da 1 uygulama.



TAHHÜT: Piyasaya sunacağımız ürünün etiket bilgileri ile içeriğinin aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde, 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

