

EC FERTİLİZER

BAKIR (Cu-Sülfat) VE ÇİNKO (Zn-Sülfat)
SIVI MİKRO BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

BOUNTY

EC FERTİLİZER

BAKIR (Cu-Sülfat) VE ÇİNKO (Zn-Sülfat)
SIVI MİKRO BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

BOUNTY

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ w/w

Suda Çözünür Bakır (Cu) % 2

Suda Çözünür Çinko (Zn) % 0,5

PIYASADAKİ MEVCUT PESTİSİTLER VE KİMYEVİ GÜBRELERİN PEK ÇOĞUYLA KARIŞABİLİR. YİNE DE UYGULANACAK KOMBİNASYON DAHA ÖNCE HİÇ UYGULANMAMIŞ İSE BİR UYUMLULUK TESTİ YAPILMALIDIR.

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ.



TESCİL NO: 12876

LİSANS NO: 422

ÜRETİM TARİHİ:

PARTİ/SERİ NO:

SON KULLANMA TARİHİ: ÜRETİM TARİHİNDEN İTİBAREN 3 YIL

Yoğunluk:

Net Ağırlık:

Net Hacim:

ÜRETİCİ FİRMA:

CUSTOM AGRICULTURAL FORMULATORS
CALIFORNIA/USA

İTHALATÇI FİRMA

ODAK TARIM TİC. LTD. ŞTİ.
ANTALYA O.S.B. 1. KISIM 10. CAD.
NO: 2 DÖŞEMEALTI / ANTALYA
TEL: 0 242 322 01 88
www.odaktarim.com

UYARILAR:

DİKKAT ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ.
ÖNERİLEN DOZAJI AŞMAYINIZ.
GÖZ, YÜZ VE DERİ İLE TEMAS ETTİRMEYİNİZ.
SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ.
KULLANIMDAN SONRA ALLERJİNİZİ BOL SU İLE YIKAYINIZ.
KULLANILMIŞ OLAN BOŞ AMBALAJLARI BAŞKA AMAÇLARLA KULLANMAYINIZ.
KULLANDIKTAN SONRA BOŞ AMBALAJLARI İMHA EDİNİZ.
TOPRAK VE/VEYA YAPRAK ANALİZİ YAPTIRILARAK GÜBRE KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR.

DEPOLAMA:

ÜRÜNÜ SERİN VE KURU BİR YERDE MUHAFAZA EDİNİZ.
ÜRÜNÜ DİREKT GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ BIRAKMAYINIZ.
DEPOLARDA SİGARA İÇMEYİNİZ.
ATEŞLE YAKLAŞMAYINIZ.
PATLAYICI, ALEV ALAN MADDELER VE DİĞER KİMYASALLARDAN UZAK TUTUNUZ.
DEPOLAMA SICAKLIĞI 0°C–45°C OLMALIDIR.

FİRMA BEYANI:

İMALATÇI FİRMA, TAVSİYELERİNE UYULARAK KULLANILDIĞINDA, ÜRÜNÜN KALİTESİNİ GARANTİ EDER. ANCAK, ÜRETİCİ TARAFINDAN, ÜRÜNÜN KULLANIMI, FİRMAMIZIN KONTROLÜ DIŞINDA OLDUĞUNDAN, HATALI KULLANIM VE KARIŞIMLARDAN DOLAYI OLUŞABİLECEK OLUMSUZLUKLAR İLE AMAÇ DIŞI KULLANIM VE DEPOLAMADAN DOĞACAK SORUNLARDAN FİRMAMIZ MESULİYET KABUL ETMEZ. SPESİFİKASYONA UYGUNLUĞU, SADECE ÜRÜNÜN TESLİMİ SİRASINDA, FİRMA GARANTİSİ ALTINDADIR.

SATIŞ KOŞULLARI:

TÜM TALİMATLARI DAİMA TAKİP EDİNİZ. ÜRETİCİ, HAVA KOŞULLARINI, UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE UYGULAMA SİRASINDA MAHSULÜN DURUMUNU KONTROL EDEMEZ. ALICI, ETİKETTEKİ TALİMATLARA AYKIRI BİR ŞEKİLDE KULLANILDIĞINDA, ÜRÜNÜN KULLANILMASI, SAKLANMASI VEYA TAŞINMASIYLA İLGİLİ TÜM RİSKLERİ ÜSTLENİR.

UYGULAMA DOZAJLARI VE KULLANIMI:

BU ÜRÜNÜ SPREY TANKINA HER ZAMAN PESTİSİTTEN ÖNCE EKLENMELİ VE KULLANIMDAN ÖNCE İYİ ÇALKALANMALIDIR.

TÜM BİTKİLER İÇİN DOZLAR: YAPRAKTAN UYGULAMALARDA: 1000 M²'YE 200 ml–250 ml DÜŞECEK ŞEKİLDE, ÇİÇEKLENME ÖNCESİ VE SONRASI, SEZON ORTASI VE HASAT ÖNCESİNDE UYGULANMALIDIR.

TOPRAK UYGULAMALARINDA: GENEL OLARAK 1000 M² ALANA 500 ml–800 ml DÜŞECEK ŞEKİLDE UYGULANMALIDIR.

Piyasaya süreceğimiz ürün üzerindeki etiket bilgisinin, bu etiketin aynısının olacağını, taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde, 7223 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.