ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
NK'LI SIVI ORGANOMİNERALGÜBRE

DARK

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ	(w/w)
Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 3
Üre Azotu (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	% 10
Maksimum Klor (Cl)	% 1,5
pH	11 - 13

DEPOLAMA ŞARTLARI
*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0°C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini 3 yıl korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ
Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür, hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

KARIŞABİLİRLİK
Birçok gübre ve zirai ilaç ile karışabilir. Karıştırmadan önce test edilmesi tavsiye edilir.

UYARILAR
* Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas ettiğinde, hemen bol su ile yıkayınız, yutmayınız. *Yutulması halinde, doktora başvurunuz. *Gübreleme esnasında, Maske, Eldiven ve Gözlük kullanınız.*Boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, imha ediniz. *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

KULLANILDIĞI BİTKİLER, UYGULAMA ZAMANI ve MİKTARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	UYGULAMA ŞEKLİ	
		YAPRAKTAN (g./100L su)	TOPRAKTAN (kg/da)
Sera ve Açık Tarla Sebzelerinde; Kavun, Karpuz, Çilek vb.	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır	100– 200	1– 3
Elma, Armut,Ayva, Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik vb.	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır	200– 300	1– 3
Üzüm, Muz, Nar, İncir, Narenciye, Zeytin, Çay vb.	Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır	200– 300	1– 3
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane vb.	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır	200– 300	1– 3
Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar vb.	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır	200– 300	1– 3
Soğan, Sarımsak vb.	Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır	200– 300	1– 3
Şeker Pancarı, Patates, Çeltik vb.	Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır	200– 300	-
Süs Bitkileri, Kesme Çiçekçilik	Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır	200– 300	1– 3
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola, Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar vb.),Baklagiller, Yem Bitkileri vb.	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır	200– 300	-
Yeşil alanlar	İhtiyaç duyulduğa 2-3 kez uygulanır	200– 300	-

FİRMA BEYANI:
Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Spesifikasyona uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız ürün içeriğinin, Etiketindeki ve Tescil belgesindeki bilgiler ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde, 7223 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

ÜRETİCİ FİRMA
ODAK TARIM TİC. LTD. ŞTİ.
AOSB 1. Kısım, 10.CAD NO:2, Döşemealtı/ANTALYA
Tel: +90 242 322 01 88
www.odaktarim.com



NET HACİM:

Tescil No :
Lisans No : 497
Son Kul. Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıl

Üretim Tarihi
Parti / Seri No