

EC
FERTILIZER

LIQUID COPPER %5

BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ (BAKIR SÜLFAT İÇERİKLİ)

EC FERTILIZER

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ : W/W
Suda Çözünür Bakır (Cu) : % 5

LIQUID COPPER %5 tüm tarla bitkileri, sebzeler ve meyve ağaçları için formüle edilmiştir. Tüm damlama sulama sistemleri ve püskürtme araçlarıyla kullanılabilir. **LIQUID COPPER %5** tek başına uygulanabileceği gibi, kimyevi gübreler ve pestisitlerin pek çoğu ile karıştırılarak toprağa ve yaprağa tatbik edilebilir. Yinede uygulanacak kombinasyon ilk defa tatbik edilecekse küçük bir kapta hazırlanan karışım dar bir alanda uygulanarak test edilmelidir.

TESCİL NO :
LİSANS NO : 422
SON KULLANMA TARİHİ : ÜRETİMDEN İTİBAREN 3 YIL
ÜRETİM TARİHİ :
PARTİ NO :
YOĞUNLUK :
NET AĞIRLIK :
NET HACİM :

ÜRETİCİ FİRMA:
CUSTOM AGRICULTURAL
FORMULATORS
CALIFORNIA / U.S.A

İTHALATÇI FİRMA :
ODAK TARIM LTD. ŞTİ.
AOSB 1. Kısım, 10.CAD NO:2,
Döşemealtı/Antalya
TEL: 0 242 322 01 88
www.odaktarim.com

EC
FERTILIZER

LIQUID COPPER %5

BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ (BAKIR SÜLFAT İÇERİKLİ)

UYARILAR: * Dikkat! çocuklardan uzak tutunuz. * Önerilen dozu aşmayınız.
* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. * Sadece gerekli yerlerde kullanınız.
* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra boş ambalajları imha ediniz.
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA: * Ürünü serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. * Ürünü direk güneş ışığına maruz bırakmayınız. * Depolarda sigara içmeyiniz.
* Ateşle yaklaşmayınız. * Patlayıcı alev alan maddeler ve diğer kimyasallardan uzak tutunuz. * Depolama sıcaklığı 0 °C - +45 °C olmalıdır.

SATIŞ KOŞULLARI: Tüm talimatları daima takip ediniz üretici, hava koşullarını, uygulama yöntemlerini ve uygulama sırasında mahsülün durumunu kontrol edemez alıcı, etiketteki talimatlara aykırı bir şekilde kullanıldığında, ürünün kullanılması, saklanması veya taşınmasıyla ilgili tüm riskleri üstlenir.

FİRMA BEYANI: Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Spesifikasyona uygunluğu, sadece ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

UYGULAMA DOZLARI VE KULLANIMI: Bu ürünü tanka her zaman pestisitten önce eklenmeli ve kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır. Fosfor içeren gübrelerle ile karıştırmayınız.

TÜM BİTKİLER İÇİN DOZLAR: (Yetiştirme periyodu boyunca, ihtiyaç duyuldukça) Yapraktan uygulamalarda 1000 m² ye 200-250 ml düşecek şekilde uygulama yapılmalıdır. İhtiyaca göre 10-14 gün aralıklarla ile tekrarlanmalıdır. Toprak uygulamalarında da 1000 m² alana 500-800 ml uygulanmalıdır.

Piyasaya sunacağımız ürün içeriğinin, Etiketindeki ve Tescil belgesindeki bilgiler ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde, 7223 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.



**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!**